


● ***Benvinguts***
● ***a Alpicat***



Festa d'arribada dels ànecs
al Parc del Graó

24 de març de 2000

16 h

ÀNEC DE LA CAROLINA. És l'ànec americà més colorit. Va estar a punt d'extingir-se a principis del segle XX. S'alimenten d'insectes i petites llegums. Nien als arbres o als forats vells del " Pájaro Carpintero" . Pon de 10 a 15 ous per temporada.



CIGNE BLANC. El seu plomatge és blanc. La femella és una mica més petita que el mascle. El seu hàbitat és el centre i el nord d'Europa, també el centre d'Àsia, Amèrica del Nord, Sudàfrica, sud-est d' Austràlia i Nova Zelanda. La seva època reproductora és a la primavera. Les parelles s'aïllen i defensen el lloc on nidifiquen. La femella pon de 4 a 7 ous que incuba 36 dies. El seu aliment són vegetals tendres i grans. Les poblacions d'Europa són sedentàries.



El mascle es diu Sol i la femella Lluna.

XIBEC. El mascle presenta entre finals d'octubre fins al proper juny una caputxa de plomes petites i fines de color roig viu. La femella té unes coloracions més mimètiques. És un animal molt àgil i vola molt de pressa. La seva dieta consisteix en algues, cargols i altres mol·luscs. Les femelles construeixen el niu al terra i el camuflen. Ponen de 6 a 12 ous, que incuben 28 dies.



ÀNEC MANDARÍ. Mesura entre 41 i 51 cm i pesa entre 444 i 500 gr. El mascle presenta tonalitats taronja, femella té uns colors hàbitat és a Rússia i al Japó. La seva dieta un plomatge vistós amb verd, marró i blanc. La més mimètics. El seu nord-est de Xina i el consisteix en llavors, plantes i animals aquàtics. Són animals solitaris i es reproduïxen amb parelles aïllades. Ponen entre 9 i 12 ous, la seva incubació dura 28 a 30 dies.



ÀNEC BLANC. Les seves mides són entre 49 i 66 cm de longitud, pesa de 500 g a 1,5 kg. En el seu plomatge predominen les tonalitats blanques tot i



que el cap i el coll són negres, amb una banda marronosa a la part del pit. El seu hàbitat és el nord-est d'Europa i la regió mediterrània. En la part d'Àsia els trobem al nord-est de Xina, fins a l'Afganistan.

S'alimenten amb mol·luscs i petits crustacis. En algunes èpoques de l'any és un animal sociable però busca la solitud per anidar. Pon de 8 a 15 ous, que incuba uns 29 dies.

XARXET "ZINABRIO". Viu en zones subtropicals. Algunes varietats d'aquesta sud de Califòrnia, Costa de Texas, Florida. La seva característica principal podem reconèixer-los perquè són



tropicals o espècie viu al nord i Louisiana i sud de és el color; també cridaners.

XARXET DE COLLAR. Els diferents blancs de la part superior estan contrastats amb una línia que creua des del coll fins al bec. Tenen una taca de color verd fluorescent, que és més visible quan els ànecs tenen les ales obertes, i per dalt tenen un color roig-granat



OCA DE MAGALLANES. Viu a la Patagònia, la Terra de Foc i les Illes Malvines. El seu plomatge és blanc amb ratlles transversal negres, el dors bru i el cap i el coll blancs en el mascle i marrons en la femella. Ponen entre tres i sis ous cada vegada. La parella participa conjuntament de la cria dels pollets.

El seu nom és Pinxo (mascle) i Estel (femella).

OCA DE L'ÍNDIA. Viu a la serralada de l'Himàlaia. Pon entre tres i sis ous. El seu plomatge es caracteritza per una tonalitat grisa i al cap té línies negres amb un fons blanc. S'alimenta, bàsicament, de vegetals.

S'anomenen Llac (mascle) i Noka (femella)



Teniu cura de mantenir netes les instal·lacions.

Comuniqueu a l'Ajuntament qualsevol anomalia que observeu (instal·lacions, conducta dels animals, etc.).

No inquieten els ànecs i respecten-los.

Observeu-los i apreneu.



Ajuntament d'Alpicat